



Vademecum Reproducción



COMPROMETIDOS CON LA SANIDAD ANIMAL



**La línea reproductiva
más completa para IATF**



Benzoato de Estradiol Von Franken

Frasco ampolla de 100 ml

Composición

Benzoato de estradiol.....100,00 mg
Excipientes csp.....100 ml

Indicaciones

El Benzoato de Estradiol Von Franken complementa el uso de progestágenos en la sincronización de celos y ovulación en bovinos cíclicos o en anestro. Está indicado también toda vez que se requiera un efecto estrogénico.

Posología y vía de administración

Vía IM.

En IATF: aplicar 2 ml IM el día de la inserción del Dispoce. Dependiendo del protocolo se coloca 1 ml a las 24 hs del retiro del Dispo.



Cipionato de Estradiol Von Franken

Frasco ampolla de 100 ml

Composición

Cipionato de Estradiol.....50 mg
Excipientes csp.....100 ml

Indicaciones

Indicado para su uso dentro de programas de inseminación artificial en protocolos que combinan progestágenos, prostaglandinas y estrógenos. En el ganado, los ésteres sintéticos de estradiol están indicados para inducción y sincronización de celos y para terapia hormonal (retención de placenta, anestro, metritis, piómetra y fetos momificados).

Posología y vía de administración

Vía IM.

En IATF: aplicar 1 ml IM el día del retiro del dispositivo.

Para otros usos según criterio profesional.



Dextrogenol

Prostaglandina

Fco. amp. x 20 ml

Composición

D-Cloprosteno.....7,5 mg
Excipientes csp.....100,00 ml

Indicaciones

Sincronización e inducción del estro en vacas; inducción del parto en vacas, cerdas y yeguas; disfunciones ováricas por presencia de cuerpo lúteo; anestro post-parto; celos silenciosos; ciclos anovulatorios e irregulares; cuerpo lúteo persistente; quistes luteínicos; endometritis; piómetras; interrupción de la gestación (en la primera mitad); fetos momificados; metropatías post-puerperales; retardo en la involución uterina.

Posología y vía de administración

Vía intramuscular profunda.

Vacas: 2 ml (0,150 mg de D-Cloprosteno)

Cerdas: 1 ml (0,075 mg de D-Cloprosteno)

Yeguas: 1 ml (0,075 mg de D-Cloprosteno)



Dalmaprost

Cloprosteno dextrógiro

Frascos de 20 ml

Fórmula

D-Cloprosteno.....0,075 mg

Indicaciones

Sincronización e inducción del estro en vacas. Inducción del parto en vacas, yeguas y cerdas. Inducción del estro en yeguas.

Disfunciones ováricas. Celos silenciosos. Cuerpo lúteo persistente. Endometritis, Piómetras.

Interrupción de la preñez (en la primera mitad). Fetos momificados. Retardo en la involución uterina.

Dosis y Modo de uso

Vía IM.

Vacas: 2 ml.

Cerdas: 1 ml.

Yeguas: 1 ml.



Dalmarelin

GnRH análogo de acción prolongada

Frascos de 10 ml

Fórmula

Lecirelina.....25 mcg
Excipientes c.s.p.....1,00 ml

Indicaciones

Bovinos: quistes ováricos foliculares, inducción del ciclo en anestros o ciclos irregulares, calores breves, celos silenciosos, vacas repetidoras, sincronización de la ovulación, mejoramiento de la fertilidad.

Yeguas y conejas: inducción de la ovulación. Aumento del porcentaje de preñez.

Dosis y Modo de uso

Vía IM.

Vacas: 2-4 ml según el caso a tratar.

Yeguas: 4 ml.

Conejas: 0,2-0,3 ml.



Buserelin VF

Buserelina

Frascos de 50 ml

Caja con 12 frascos de 10 ml

Fórmula

Acetato de buserelina (hormona liberadora de las gonadotropinas, sintética).....0,00042 g
Agentes de formulación.....c.s.p.

Indicaciones

Vacas: Tratamiento de trastornos de la fertilidad de origen ovárico: quistes foliculares, aciclia, anestro, ovulación retardada y atresia folicular. Incrementa el índice de concepción en la inseminación artificial y después de la sincronización del celo.

Yeguas: Tratamiento de trastornos quísticos de los ovarios acompañados o no de celo prolongado o permanente; y aciclia. Inducción de la ovulación (en celo prolongado, permanente, para fijar el tiempo de la ovulación y la monta, para mejorar el índice de concepción).

Administración

Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa.

Dosificación

Vacas: Quistes foliculares, aciclia y anestro: 5 ml; ovulación retardada, atresia folicular, incremento del índice de concepción en la inseminación artificial y tras la sincronización del celo: 2,5 ml.

Yeguas: Trastornos quísticos de ovario, con o sin celo prolongado o permanente, inducción de la ovulación y monta, mejora del índice de concepción, celo prolongado o permanente: 10 ml; aciclia: 2 veces 5 ml con intervalo de 24 hs.



Corion

Gonadotropina Coriónica equina

Producto para el manejo de la reproducción.

Hormonal – Gonadotropina

1 frasco ampolla con 5000 UI de eCG.

1 frasco ampolla con 25 ml de solvente

Composición

Cada frasco liofilizado contiene 5000 U.I. de eCG ó PMSG.

Una vez reconstituido con el total del diluyente adjunto contiene 200 UI/ml.

Indicaciones

Se indica para inducción del estro y para revertir hembras en estado de anestro.

En machos Corion eCG estimula el desarrollo del tejido intersticial de los testículos y de las glándulas sexuales (vesículas seminales y próstata). También se utiliza para mejorar la calidad y cantidad de semen y la disfunción de la libido.

Dosis y vía de aplicación

En vacas su administración es intramuscular y su dosis es:

Superovulación: 2500 – 3000 UI/animal.

Sincronización de celo: 400 UI/animal.

Dosis sugeridas y pueden ser modificadas según criterio profesional.



Dispocel Monouso

Progesterona 0,6 g

Doy pack conteniendo 10 dispositivos intravaginales

Composición

Progesterona.....0,6 g
Silicona inerte.....c.s.

Indicaciones

Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas para Inseminación a Tiempo Fijo o a celo detectado. Tratamiento del anestro post-parto. Acortamiento del período parto concepción.

Posología y vía de administración

Administrar un dispositivo por hembra mediante el aplicador intravaginal según las instrucciones del prospecto.
Ver programas de uso para IATF.



Dispocel Max

Progesterona 1,2 g

Doy pack conteniendo 10 dispositivos intravaginales

Composición

Progesterona.....1,2 g
Silicona inerte.....c.s.

Indicaciones

Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas para Inseminación a Tiempo Fijo o a celo detectado. Tratamiento del anestro post-parto. Acortamiento del período parto concepción.

Posología y vía de administración

Administrar un dispositivo por hembra mediante el aplicador intravaginal según las instrucciones del prospecto.
Ver programas de uso para IATF.



Dispocel Monouso Vaquillas

Progesterona 0,6 g

Doy pack conteniendo 10 dispositivos intravaginales

Composición

Progesterona.....0,6 g
Silicona inerte.....c.s.

Indicaciones

Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas para Inseminación a Tiempo Fijo o a celo detectado. Tratamiento del anestro post-parto. Acortamiento del período parto concepción.

Posología y vía de administración

Administrar un dispositivo por hembra mediante el aplicador intravaginal según las instrucciones del prospecto.
Ver programas de uso para IATF.



Pack Dispocel Monouso

Progesterona 0,6 g

100 tratamientos

Pack conteniendo

- 10 Dispocel Monouso x 10 dispositivos
- 10 frascos Dextrogenol x 20 ml
- 1 Aplicador
- 3 frascos Benzoato de Estradiol x 100 ml
- 2 frascos Benzoato de Estradiol x 100 ml +
- 1 frasco Cipionato de Estradiol x 100 ml



Pack Dispocel Max

Progesterona 1,2 g

100 tratamientos

Pack conteniendo

- 5 Dispocel Max x 10 dispositivos
- 10 frascos Dextrogenol x 20 ml
- 1 Aplicador
- 3 frascos Benzoato de Estradiol x 100 ml
- 2 frascos Benzoato de Estradiol x 100 ml +
- 1 frasco Cipionato de Estradiol x 100 ml



Pack Dispocel Monouso Vaquillas

Progesterona 0,6 g

100 tratamientos

Pack conteniendo

- 10 Dispocel Monouso x 10 dispositivos
- 10 frascos Dextrogenol x 20 ml
- 1 Aplicador
- 3 frascos Benzoato de Estradiol x 100 ml
- 2 frascos Benzoato de Estradiol x 100 ml +
- 1 frasco Cipionato de Estradiol x 100 ml



Pack Dispocel Monouso J-Synch

Progesterona 0,6 g

100 tratamientos

Pack conteniendo

- 10 Dispocel Monouso x 10 dispositivos intravaginales
- 2 Benzoato de Estradiol x 100 ml
- 10 Dextrogenol x 20 ml
- 10 Dalmarelin x 20 ml (Lecirelina) o 4 Buserelin VF x 50 ml



